

پعاد موضعی رکوبیزول® - ۲۰۰ مگرام

گیاه بابونه آلمانی با نام علمی «*Matricaria chamomilla*» یا «*Matricaria recutita*» و نام عمومی کامومیل «*German chamomile*» در طب سنتی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و از گذشته‌های دور مصارف درمانی متعددی داشته است. امروزه منابع معتبر دنیا، بسیاری از مصارف سنتی بابونه را مورد تأیید قرار داده‌اند. شرکت داروسازی گیاهی «نو تک فار» با استناد به مدارک موجود در منابع علمی، اقدام به فرمولاسیون و تولید پماد «رکوبیزول» با استفاده از مواد مؤثره‌ی گل‌های گیاه بابونه آلمانی نموده است. علاوه بر آن از مواد مؤثره‌ی گل همیشه بهار با نام علمی «*Calendula officinalis*» و نام عمومی «*Calendula*» جهت ایجاد عطر و بوی مطبوع و تقویت اثرات ضد التهابی این دارو استفاده شده است.

موارد مصرف:

اگزماهای حاد و مزمن، خارش و التهاب کهیر، ادرار سوختگی اطفال، التهاب - سوزش و خارش پوست، سوختگی‌ها و زخم‌های سطحی، هموروئید، التیام محل گزش حشرات، دمل و کورک، راش‌های جلدی، خشکی و ترک پوست و لب

مقدار و نحوه مصرف:

روزی ۳-۴ بار، هر بار یک لایه نازک از پماد روی موضع مورد نظر مالیده شود (تا از بین رفتن علائم بیماری، درمان را ادامه دهید).

- در برخی موارد قرار گرفتن پماد روی موضع ممکن است موجب سوزش ملایمی گردد که طبیعی است و پس از چند ثانیه رفع می‌گردد.

عارض جانی:

برای مصارف پوستی این دو گیاه عارضه‌ای گزارش نشده است. افرادی که سابقه قبلی حساسیت به ترکیبات بابونه و گل همیشه بهار دارند از مصرف این دارو خودداری نمایند. در صورت مشاهده هرگونه حساسیت احتمالی از ادامه مصرف دارو خودداری نمایید.

تداخلات دارویی:

در مصرف فرآورده‌های حاوی بابونه تداخلی گزارش نشده است.

صرف در بارداری و شیردهی:

صرف این دارو در دوران بارداری و شیردهی مجاز می‌باشد.

شرابیت نگهداری:

دمای مناسب نگهداری ۲۵-۴۰ درجه سانتی‌گراد می‌باشد. ازیخ زدگی و درجه حرارت بالا و پائین محافظت نمایید. بعد از هر بار استفاده درب آن را محکم بیندید.

بسته بندی:

دارو به وزن خالص ۲۰ گرم در هر تیوب، داخل جعبه به همراه برگه راهنمای عرضه می‌گردد.

نکات قابل توجه:

- این دارو فقط جهت مصارف پوستی است (از مصرف خوارکی، چشمی، اطراف چشم و واژنیان آن خودداری شود). جهت مصرف برای رفع التهاب هموروئید و خارش و التهابات نواحی تناسلی به صورت موضعی قابل استفاده می‌باشد.

- جهت مصارف ادرار سوختگی اطفال و التهاب پوستی در موضعی مانند کشاله ران، زیر بغل و کلاً نواحی عرق‌سوز شده، به منظور رسیدن به نتیجه مطلوب، ابتدا موضع مورد نظر را شسته و خشک نمایید، سپس از پماد استفاده کنید.

- مصرف این دارو در نوزادان با سن کمتر از یک ماه توصیه نمی‌شود.

- چنانچه پس از مصرف مداوم این دارو تا دو هفته، علائم بیماری همچنان ادامه داشت، جهت ادامه درمان با پزشک خود مشورت نمایید.

- دارو را دور از دسترس کودکان قرار دهید.

پعاد موضعی رکوبیزول® - ۲۰۰ مگرام

اطلاعات تخصصی:

به استناد مرجع معتبر PDR گل‌های بابونه آلمانی حاوی ۱/۵-۴٪ درصد اسانس می‌باشند. دو ماده اصلی اسانس، آلفاییزابولول (لوومنول) و کاماژولن^۱ می‌باشند که مجموعاً ۶۵-۵۰٪ درصد از حجم اسانس بابونه را شامل می‌شوند. کامومیل^۲ همچنین محتوی فلاونوئیدهای مانند آپی‌ژنین^۳ و لوئولین^۴ می‌باشد. سایر مواد مانند موسیلاژها^۵، کومارین‌ها^۶، مقداری تانن^۷ و مواد متعدد دیگر در مقادیر متفاوت در عصاره بابونه آلمانی وجود دارند.

عملکردهای فارماکولوژیکی متعددی برای مصرف موضعی این گیاه ثبت شده است که برخی از آنها عبارتند از: اثرات ضدالتهابی، ضدبакتریائی، ضدبیرونی و درمان زخم‌ها

کامومیل اثرات ضدبакتری و اثر مهاری بر برخی میکروب‌های بیماری‌زای پوستی نظیر استافیلوکوک^۹ ها و گونه‌های کاندیدا^{۱۰} داشته و در بهبود سریع زخم‌ها خصوصاً زخم‌های ترشح دار اثرات خوبی از خود نشان می‌دهد. اثر ضدبакتری، ضدقارچی و درمان زخم‌آن بیشتر مربوط به آلفاییزابولول و آپی‌ژنین موجود در آن است. عملده اثرات ضدالتهابی کامومیل مربوط به آلفاییزابولول و کاماژولن می‌باشد.

کاماژولن اثر ضدالتهابی خود را از طریق مهار لوكوترين^{۱۱} B اعمال می‌کند. همچنین با تأثیر بر آدرنال موجب آزادسازی کورتیزون شده در نتیجه آزادسازی هیستامین را کاهش می‌دهد. از طرفی مواد مؤثره‌ی بابونه آلمانی مسیر سیکلواکسیژناز را مهار کرده در نتیجه موجب مهار سنتز پروستاگلاندین‌ها و لوكوترين‌ها و کاهش التهاب می‌شود. لازم به ذکر است که در مطالعات بالینی مختلف که روی اثرات عصاره این گیاه انجام گرفته، مشاهده شده است که می‌تواند در مصرف موضعی، پاپیلوماهای پوستی را مهار کرده و تبدیل پاپیلوما^{۱۲} به کارسینوما^{۱۳} را کاهش دهد (به نظر می‌رسد آپی‌ژنین موجود در عصاره این خاصیت را ایجاد می‌کند). در ضمن مطالعات نشان می‌دهد عصاره بابونه اثر توموزانی اشعه UV را مهار می‌کند. طبق مشاهدات بالینی تأثیر عصاره بابونه بر زخم‌ها به خصوص زخم‌های ترشح دار قابل توجه می‌باشد و می‌تواند در درمان زخم‌ها، سوختگی‌های سطحی، زخم‌های ناشی از تاتوو و ضایعات پوستی مشابه مصرف شود. پماد «رکوبیزول» در بیماران دچار التهابات پوستی و همچنین اگزماهای حاد و اگزماهای مزمن اثرات بسیار خوبی از خود نشان داده است و با توجه به اینکه پماد «رکوبیزول» از دسته داروهای استروئیدی نمی‌باشد و عوارض ناشی از مصرف کورتیکواستروئیدها را ندارد، این نتیجه می‌تواند بسیار مطلوب و قابل توجه باشد. با توجه به اثر بخشی فرم موضعی کامومیل در درمان دمل و کورک می‌توان نتیجه گرفت که این دارو در درمان فولیکولیت‌های سطحی نیز اثرات خوبی از خود نشان دهد.

جهت دستیابی به عطر و بوی مطبوع تر و تقویت اثرات این دارو مواد مؤثره‌ی گل همیشه بهار به آن افزوده شده است. مواد مؤثره‌ی گل همیشه بهار در التیام جراحات، جوش‌ها، التهابات و راش‌های جلدی مؤثر است.

در صورت نیازمی توانید از طریق مراجعه به سایت شرکت به آدرس www.ktp.co.ir و یا ارسال ایمیل به نشانی Info@ktp.co.ir پیام خود را ارسال و یا با شماره ۸۸۳۹۰۷۴۵ تماس حاصل نمایید.

References:

- 1 - PDR 2010
- 2 - Alternative Medicine Review Volum 13, Number 1, 2008
- 3 - Martindale 35
- 4 - International Journal of Pharmaceutical Sciences and Drug Research 2010, 2(1); 12-16
- 5 - MedlinePlus
- 6- WHO Monograph
- 7- Natural Medicines Comprehensive Database
- 8- فارماکویه گیاهی ایران - 8

اجزاء بکار رفته در فرآورده: مواد مؤثره‌ی گل بابونه، مواد مؤثره‌ی گل همیشه بهار، زیربغل، اسید بیرونیک

- | | | | | |
|------------------------------|----------------|--------------|------------------|------------|
| 1.Alpha-bisabolol(Levomenol) | 2.Chamazulene | 3.Chamomile | 4.Apigenin | 5.Luteolin |
| 6.Mucilage | 7.Coumarin | 8.Tannin | 9.Staphylococcus | |
| 10.Candida | 11.Leukotriene | 12.Papilloma | 13.Carcinoma | |