

# میگرافار® Migraphar®



مواد مؤثره گیاهی تاناستوم و کامومیل  
 ۶۰ عدد کپسول خوراکی ۲۴۰ میلی گرمی

موارد مصرف:

- حمله حاد میگرن و تهوع ناشی از آن
- پیشگیری از بروز سردردهای میگرنی
- درمان انواع سردرد نظیر سردردهای خوشه‌ای و تنشی، سردردهای قبل و حین قاعدگی



## درمان را در طبیعت بجوییم

ما تعداد زیادی محصول نداریم ولی سعی داریم با کیفیت ترین ها را تولید کنیم



Tanacetum parthenium

Migraphar

KTP  
 Know.Tech.Pharm  
 www.ktp.co.ir  
 Info@ktp.co.ir

پخش توسط شرکت های: توزیع داروپخش، داروگستر نخبگان، داروگستر یاسین، طبیعت زنده (سینره)، اکسیر، داروگستر ارمان طبیعت سبز، گیتی سلامت آریا، نیک فردای سالم (نفس) و سینا پخش صبا عرضه در داروخانه های سراسر کشور تلفن: ۸۸۹۸۶۴۸۳ و ۸۸۹۸۷۰۵۳

# میگرافار® Migraphar®

## میگرافار® Migraphar®

شکل دارویی: کپسول ۲۴۰ میلی گرمی

کپسول گیاهی «میگرافار» از مواد مؤثره گیاهی تاناستوم با بایوبه‌ی گاوچشم (از تیره کاستنی) با نام علمی «Tanacetum parthenium» و نام عمومی «Feverfew» ساخته شده است که مقالات و رفرانس‌های معتبر و متعددی در زمینه استفاده از این گیاه جهت تسکین سردردهای میگرنی وجود دارد. علاوه بر آن از مواد مؤثره گیاهی بایوبه آلمانی با نام علمی «Matricaria recutita» و نام عمومی «German chamomile» نیز استفاده شده است که با اثرات آرام بخشی و ضد اضطرابی خود، به تقویت اثرات این کپسول کمک می‌کند.

موارد مصرف:

- حملات حاد میگرن و تهوع و استفراغ ناشی از آن
- پیشگیری از بروز سردردهای میگرنی
- درمان انواع سردرد نظیر سردردهای خوشه‌ای و تنشی، سردردهای قبل و حین قاعدگی « مکانیسم های چند گانه اثر»

۱- مهار سنتز پروستاگلاندین ها:

به دلیل وجود مقادیر درمانی پارتنولاید<sup>۱</sup> (ماده مؤثره اصلی گیاه تاناستوم) و دیگر مواد مؤثره گیاهی نظیر ترانس کریزانتیل استات<sup>۲</sup> اثرات ضد درد و ضد التهابی مشاهده می‌گردد. یک مکانیسم شناخته شده مربوط به اثر ضد درد و ضد التهابی تاناستوم، مهار فسفولیپازهای سلول توسط پارتنولاید است که از آزاد شدن آراشیدونیک اسید جلوگیری می‌کند. از آنجاییکه آراشیدونیک اسید پیش ساز واسطه‌های التهابی می‌باشد با مهار آن اثرات ضد التهابی مشاهده می‌گردد. همچنین طبق تحقیقات مشخص شده است که پارتنولاید و ترانس کریزانتیل استات موجب مهار پروستاگلاندین سنتتاز می‌شوند که در نتیجه موجب کاهش سنتز پروستاگلاندین ها و ترومبوکسان می‌گردند. به این ترتیب مדיاتورهای التهابی مربوطه ساخته نمی‌شوند و اثر ضد التهابی از این طریق اعمال می‌گردد.

۲- مهار ترشح گرانولی پلاکت ها:

از آنجاییکه سروتونین نقش مهمی در پاتوژنز سردردهای میگرنی دارد و از طرفی خاصیت تراکم و چسبندگی پلاکت‌های بیماران میگرنی بیشتر از افراد معمولی می‌باشد، در ضمن آزادسازی سروتونین از پلاکت ها در اثر برخی عوامل مانند آدرنالین تشدید می‌گردد، به همین سبب یکی دیگر از مکانیسم‌های تأیید شده در مورد اثرات ضد میگرنی مواد مؤثره تاناستوم مهار ترشح گرانولی پلاکت‌های خون و لوکوسیت‌های پلی مورفونوکلنار<sup>۳</sup> است. پارتنولاید موجب مهار تجمع پلاکتی و مهار ترشح سروتونین (5-HT) به وسیله پلاکت‌ها می‌شود و به این ترتیب از بروز سردردهای میگرنی جلوگیری می‌کند.

منع مصرف:

- افرادی با حساسیت شناخته شده نسبت به گیاهان خانواده آستراسه و به طور خاص به گیاه تاناستوم پارتنیوم
- کودکان زیر ۲ سال
- افرادی با مشکل بلع کپسول

مصرف در بارداری و شیردهی:

مصرف این دارو در دوران بارداری و شیردهی مجاز نمی‌باشد.

نکات قابل توجه:

- ۱- دارو را در جای خشک و خنک و دور از نور نگهداری کنید.
- ۲- مصرف دارو با راهنمایی پزشک یا داروساز انجام شود و مصرف دارو را یکبار قطع نکنید.
- ۳- در سالمندان، افراد حساس و بیماران با مشکلات کبدی و کلیوی و کمبود ویتامین K این دارو باید با احتیاط مصرف گردد.

### References:

- 1- PDR 2010
- 2- Martindale 35
- 3- WHO Monograph
- 4- Pharmacognosy Review 2011 Jan-Jan; 5(9):103-110
- 5- فرماکوپه گیاهی ایران

- 1- Parthenolide
- 2- Transchrysantyl acetate
- 3- Polymorphonuclear leukocytes



Tanacetum parthenium

۳- کاهش اسپاسم عضلات صاف عروق:

تاناستوم با بلوک کانال‌های پتاسیمی موجب مهار اسپاسم عضلات صاف عروق می‌شود و از این طریق نیز در مهار سردردهای میگرنی مؤثر است.

۴- وجود بایوبه آلمانی در این کپسول به دلیل دارا بودن آپی ژنین که به عنوان یک لیگاند برای رسپتورهای بنزودیازپینی عمل می‌کند و دارای اثر سینرژیک با آپی ژنین موجود در گیاه تاناستوم می‌باشد موجب افزایش اثرات ضد اضطرابی و آرام بخشی این دارو می‌گردد.

مقدار و نحوه مصرف:

جهت پیشگیری:

افراد بالغ: روزی ۲ تا ۴ بار هر بار یک کپسول

کودکان: روزی ۱ تا ۲ کپسول

جهت متوقف کردن حمله میگرن:

افراد بالغ: هر ۶ ساعت یک کپسول

کودکان: تا ۲ کپسول در روز

- پس از رفع سردرد مطابق مقدار و نحوه مصرف جهت پیشگیری، درمان ادامه یابد.

- بهتر است این دارو همراه یا بعد از غذا و با یک لیوان آب به صورت کامل بلعیده شود.

مدت مصرف:

جهت پیشگیری، مصرف دارو را تا ۴ ماه ادامه داده سپس با مشورت پزشک یا داروساز درمان با دوز نگهدارنده ( حداقل دوز مصرفی که با مصرف آن سردرد عود نمی‌کند ) تا دو ماه دیگر ادامه یابد.

- قطع ناگهانی دارو می‌تواند باعث برگشت سردرد، بی خوابی، تحریک پذیری و ... شود بنابراین برای قطع مصرف دارو بهتر است با مشورت پزشک یا داروساز به تدریج از دوز مصرف کاسته شود.

عوارض جانبی:

عوارض جانبی خفیف و گذرایی در برخی افراد ممکن است مشاهده گردد که عبارتند از: اختلالات گوارشی مانند دردهای شکمی، اسهال، یبوست، نفخ، افزایش ضربان قلب و سرگیجه

در افراد حساس به گیاه تاناستوم، احتمال بروز واکنش‌های حساسیت پوستی وجود دارد.

- التهاب دهان، حلق و تورم لب‌ها یک واکنش موضعی ناشی از تماس مستقیم مواد مؤثره این گیاه می‌باشد و در صورت بروز احتمالی زخم دهانی، مصرف دارو باید قطع گردد. با استفاده از فرم دارویی کپسول میگرافار و بلع کامل آن این عارضه ایجاد نخواهد شد.

برای دستیابی به اطلاعات بیشتر به «اطلاعات تخصصی» بروشور داخل جعبه دارو و با سایت شرکت مراجعه نمایید.