

Recolic® رکولیک



مواد موثره‌ی بابونه آلمانی، عسل
شربت ۱۲۰ میلی لیتری

موارد مصرف:

- کولیک، اسپاسم‌ها و التهابات مجاری گوارشی
- نفخ و سوء هاضمه
- کاهش التهاب و اسپاسم سندرم روده تحریک پذیر (IBS)
- پیشگیری و درمان زخم‌های معده و روده
- انتخابی مناسب جهت مصرف همزمان با داروهای ضدالتهاب غیراستروئیدی (NSAIDs) به منظور کاهش عوارض این داروها بر جداره معده



درمان را در طبیعت بجویم

ما تعداد زیادی محصول نداریم ولی سعی داریم با کیفیت ترین‌ها را تولید کنیم



برای اولین بار
حاوی پروبوسور دارو به خط بریل برای نابینایان

تلفن: ۸۸۹۸۶۴۸۳ و ۸۸۹۸۷۰۵۳ عرضه در داروخانه‌های سراسر کشور

بخش توسط شرکت‌های: به بخش داروی بهشهر، داروگستر نخبگان، داروگستر یاسین، داروگستر ارمغان طبیعت سبز و توزیع داروپخش

Recolic® رکولیک

شرکت «نو تک فار» یک شرکت دانش بنیان، متخصص در زمینه فرمولاسیون و تولید داروهای گیاهی، مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران می‌باشد. از اهداف اصلی شرکت «نو تک فار» طراحی و انجام فرمولاسیون داروهای گیاهی با کیفیت بالا و مؤثر در درمان می‌باشد و این هدف محور اصلی فعالیت گروه تحقیق و توسعه شرکت (گروه R&D) را تشکیل می‌دهد.

مصرف در بارداری و شیردهی:

گزارشات پراکنده‌ای در مورد ترجیح عدم مصرف بابونه در بارداری ذکر شده است لذا بهتر است از مصرف آن در دوران بارداری خودداری شود. با توجه به این‌که اطلاعات دقیقی در ارتباط با منع مصرف آن در دوران شیردهی در دسترس نیست لذا در صورت نیاز می‌توان با احتیاط و به مدت کوتاه مصرف نمود.

نکات قابل توجه:

- این دارو برای افراد دیابتی قابل استفاده می‌باشد.
- قبل از مصرف، بطری باید به خوبی تکان داده شود.

References:

- 1- PDR 2010
 - 2- International Journal of Pharmaceutical Sciences and Drug Research 2010, 2 (1);12-16
 - 3- Alternative Medicine Review, volume 13, No.1, 2008
 - 4- WHO Monograph
 - 5- فارماکوپه گیاهی ایران
- 1- Alpha-bisabolol 2- Chamazulene 3- Apigenin

- از آنجایی‌که آپی‌ژنین، یکی از مواد مؤثره‌ی بابونه آلمانی در این شربت، به عنوان یک لیگاند برای رسپتورهای بنزودیازپینی عمل می‌کند، این دارو اثر ضد اضطرابی و آرام‌بخشی از خود نشان می‌دهد و منجر به بهبود خواب در بیماران می‌گردد.

- در شربت رکولیک از مواد مؤثره‌ی گیاه انیسون بعنوان عطر و طعم‌دهنده طبیعی استفاده شده است که موجب تقویت اثرات مفید این دارو بر دستگاه گوارش می‌گردد.

- عسل در این شربت به عنوان یک شیرین کننده طبیعی و مفید به کار رفته است. علاوه بر آن، اثرات مهاری عسل روی هلیکوباکتریلوری قابل توجه می‌باشد.

مقدار و نحوه مصرف:

- افراد بالاتر از ۱۲ سال: روزی ۳ بار، هر بار ۱۰ میلی لیتر (۱ قاشق غذاخوری)
- افراد ۶-۱۲ سال: روزی ۳ بار، هر بار ۵ میلی لیتر (۱ قاشق مرباخوری)
- کودکان ۳-۵ سال: زیر نظر پزشک روزی ۳ بار، هر بار ۲/۵ میلی لیتر
- جهت مصرف به عنوان ضد نفخ و درمان سوء هاضمه در هر زمانی از شبانه روز بر مبنای مقادیر فوق قابل مصرف می‌باشد و در سایر موارد بهتر است سی دقیقه قبل یا بیش از یک ساعت بعد از غذا مصرف شود.

مدت مصرف:

- مصرف دارو را تا رفع کامل علائم بیماری ادامه دهید.
- در بیماری کولیک، زخم‌های گوارشی و IBS اثرات دارو از هفته دوم قابل مشاهده خواهد بود و بعد از مصرف منظم و مداوم شربت رکولیک تا ۲ ماه، اثر بخشی آن تثبیت خواهد شد. بعد از آن می‌توان از دوز دارو به تدریج کم نمود و دوز نگهدارنده آن را ادامه داد که معادل حداقل دوزی می‌باشد که اثر دارو قابل مشاهده است.

عوارض جانبی:

- در مقادیر مجاز و درمانی هیچ عارضه‌ای ندارد. مصرف مقادیر زیاد ممکن است ایجاد تهوع کند. در افرادی که نسبت به این دو گیاه حساسیت دارند ممکن است موجب ایجاد واکنش‌های آلرژیک شود.

رکولیک Recolic®

شکل دارویی: شربت ۱۲۰ میلی لیتری

شربت رکولیک از مواد مؤثره‌ی دو گیاه بابونه آلمانی با نام علمی «*Pimpinella anisum*» و انیسون با نام علمی «*Matricaria recutita*» و همچنین عسل ساخته شده است.

موارد مصرف:

- کولیک، اسپاسم‌ها و التهابات مجاری گوارشی
- نفخ و سوء هاضمه
- کاهش التهاب و اسپاسم سندرم روده تحریک پذیر (IBS)
- پیشگیری و درمان زخم‌های معده و روده
- انتخابی مناسب جهت مصرف همزمان با داروهای ضدالتهاب غیراستروئیدی (NSAIDs) به منظور کاهش عوارض این داروها بر جداره معده

مکانیسم اثر:

- مواد مؤثره‌ی موجود در این دارو نظیر آلفابیزابولول^۱ و کامازولن^۲ با مهار مسیر سیکلواکسیژناز و لیبواکسیژناز موجب مهار سنتز پروستاگلندین‌ها و لوکوترین‌ها بویژه لوکوترین B4 شده اثر ضدالتهابی از خود نشان می‌دهند.
- آلفابیزابولول و آپی‌ژنین^۳ و سایر فلاونوئیدها و کومارین‌های موجود در این دارو با شل کردن عضلات صاف دستگاه گوارش موجب بروز اثر ضداسپاسمی آن می‌گردند.

- طبق مطالعات انجام شده آلفابیزابولول فعالیت پروتئولیتیکی پپسین را در دستگاه گوارش کاهش می‌دهد و از طرفی آلفابیزابولول یک اثر حفاظتی در معده در مقابل استیل سالیسیلیک اسید از خود نشان می‌دهد. لذا انتخابی مناسب جهت مصرف همزمان با داروهای ضدالتهاب غیراستروئیدی (NSAIDs) است که در معده باز می‌شوند و بعضا موجب ایجاد خونریزی و التهاب در جدار معده می‌گردند.

- مطالعات نشان داده اند که مواد مؤثره‌ی موجود در این دارو تجمع هلیکوباکتریلوری و اشرشیاکولی را کاهش می‌دهند.



German Chamomile



Honey